

Produktbeschreibung Seite 1 von 1

Zusammensetzung:

Cypermethrin (cis/trans 40/60): 20 %
Zuschlagstoffe und Wasser: bis zu 100 %

Cypermethrin-Familie

Wirkung
Wirkungsweise
Bekämpfbares Stadium

Typ 2 der Pyrethroide, lichtstabil und beständig

Nach Kontakt und Aufnahme
Verändert die Übertragung von Nervenimpulsen.
In allen Phasen des Larvenwachstums

Produktbeschreibung

Rotryn 200 ist ein Emulsionskonzentrat mit Petroleum-Lösemittel.

Kompatibilität

Rotryn 200 ist kompatibel mit den meisten Insektiziden wird aber durch die Kombination mit alkalischen Produkten instabil.

Schadinsekten

Rotryn 200 bekämpft effektiv Schadinsekten, die Überträger von krankheitsverursachenden Mikroorganismen sein können. Rotryn 200 ist einsetzbar in zivilen, industriellen und ländlichen Bereichen. Das große Wirkungsspektrum von Cypermethrin sichert die effektive Bekämpfung von fliegenden als auch kriechenden Insekten. Die Wirkungsdauer von Rotryn 200 beträgt im Innenbereich 4 - 6 Wochen, im Außenbereich 2 - 3 Wochen.

Anwendungsbereich

- Im Innenbereich: Industrie, Privathäuser, Geschäften etc.
- Außenbereiche: Bei strikter Einhaltung der empfohlenen Dosierung auch in der Pflanzenwelt einsetzbar.

Das Produkt ist giftig für Fische und darf im Wasser nicht angewendet werden.

Gebrauchsanweisung und Dosierung

Rotryn 200 sollte 0,1 - 0,5 %ig (10 - 50 ml in 10 Liter Wasser) in Wasser verdünnt werden. Die genaue Anwendungsmenge richtet sich nach der Sensibilität der Insekten sowie der Eigenschaften der zu behandelnden Gebiete.

Die Tabelle zeigt einige mögliche Verdünnungsarten in Anlehnung an praktische Erfahrungswerte auf.

Umgebung	Ausgewachsene Mücken	Ausgewachsene Fliegen	Schaben Ameisen	Thermalnebelgeräte
Innenräume			0,3 - 0,4 %	10 ml/l
Außen/ Raumbehandlung	0,1 - 0,15 %			10 ml/l
Außen/ Flächenbehandlung		0,5 %	0,4 - 0,5 %	10 ml/l
Durchschnittliches Sprühvolumen	300 Ltr./Std.	1 Ltr. Emulsion/15 m ²	70 - 100 ml/m ²	1 Ltr. Emulsion/3000 m ³

Toxizität der aktiven Wirkstoffe

Cypermethrin ist nur mäßig giftig für Säugetiere.

Cypermethrin LD 50 akute orale Ratte : 250 - 4150 mg/kg
LD 50 akute dermale Ratte: > 2460 mg/kg

Warnhinweise

Den Anweisungen auf dem Etikett folgen. Das Sicherheitsdatenblatt lesen und Vorschriften einhalten. Von Menschen, Nahrungsmitteln, Tiernahrung, Getränken und dessen Behälter fernhalten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung gegenüber Dritte. Der Anwender ist für etwaige Schäden durch das Produkt selbst verantwortlich.

Rotryn 200

**Wasserlösliches
Emulsionskonzentrat
zur Bekämpfung von
fliegenden und kriechenden
Insekten.**

Reg. Nr. N-45405

**Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**



Firma Walter Berger
Villa Rustica 1a
84529 Tittmoning
Tel 0049 8683 8919892
Fax 0049 8683 8919896
info@amb-vertriebsgmbh.com